

Peniyet vet.



Dosering 1 ml
per 30 kg kroppsvikt
i.m.



Karenstider

Behandlingstid 3-5 / 6-7 dagar

	Får	Gris	Nötkreatur	
Slakt	4 / 6	6 / 8	6 / 8	dygn
Mjolk	6,5		4	dygn

ATC-kod QJOICE09, Receptbelagt, godkänd SPC 2024-06-18
För ytterligare information: www.fass.se



Peniyet vet. 300 mg/ml injektionsvätska, suspension.


Bensylpenicillinprokain för behandling av systemiska infektioner hos nötkreatur, får och grisar orsakade av bakterier som är känsliga för penicillin.

NORDVACC LÄKEMEDEL AB · BOX 112, 129 22 HÄGERSTEN · 08-120 10 650


nordvacc
en del av Intervacc

Peniyet vet.

300 mg/ml injektionsvätska, suspension
Bensylpenicillinprokain för nötkreatur,
får och gris.



Aktiva substanser

En ml innehåller: Bensylpenicillinprokain monohydrat 300 mg (motsvarande 170 mg bensylpenicillin), Hjälppämnen: Natrium-metylp parahydroxibensoat (E219) 1,25 mg.

Indikationer

För behandling av systemiska infektioner hos nötkreatur, får och grisar, orsakade av eller associerade med bakterier som är känsliga för bensylpenicillin.

Kontraindikationer

Injicera inte intravenöst. Använd inte vid överkänslighet mot penicilliner, cefalosporiner, prokain eller mot något av hjälpämnena. Använd inte vid svår njurinsufficiens med anuri och oliguri. Använd inte vid förekomst av β -laktamasproducerande patogener. Använd inte till mycket små herbivorer som exempelvis marsvin, ökenråttor eller hamstrar.

Dos och administreringssätt


För intramuskulär användning. Omskakas väl före användning. Rekommenderad dosering är 10 mg bensylpenicillinprokain per kg kroppsvikt (motsvarande 5,66 mg bensylpenicillin), vilket motsvarar 1 ml per 30 kg kroppsvikt dagligen. Behandlingstiden är 3 till 7 dagar. Injicera inte mer än 2,5 ml per injektionsställe hos grisar. Injicera inte mer än 12 ml per injektionsställe hos nötkreatur. Injicera inte mer än 2 ml per injektionsställe hos får. Om ingen klinisk respons ses inom 3 dagar ska diagnosen fastställas på nytt och behandlingen ändras vid behov. Lämplig behandlingstid ska väljas med hänsyn till de kliniska behoven och det behandlade djurets individuella återhämtning. Hänsyn bör tas till målvävnadens tillgänglighet och målpatogenens egenskaper.

Förpackningsinformation

Ytterkartong med 1 x 100 ml eller 30 x 100 ml innehållande 1 injektionsflaska, receptbelagd.

Karenstider för behandlingstider 3-5 / 6-7 dagar

	Gris	Nötkreatur	Får	
Slakt	6 / 8	6 / 8	4 / 6	dygn
Mjolk		4	6,5	dygn



Peniyet vet. 300 mg/ml, injektionsvätska, suspension. ATCvet-kod: QJOICE09. Djurslag: Nötkreatur, får och gris.
Försiktighet: Ska endast administreras genom djup intramuskulär injektion. Användning av läkemedlet ska baseras på resistensbestämning av bakterien som isolerats från djuret. Om det inte är möjligt ska behandlingen baseras på lokal (regional anläggningsnivå) epidemiologisk information om målbakteriens känslighet. Hänsyn ska tas till officiella, nationella och regionala antimikrobiella riktlinjer när läkemedlet används. Om läkemedlet används på ett sätt som avviker från anvisningarna i produktresumén kan det öka förekomsten av bakterier som är resistent mot bensylpenicillin och minska effekten av behandling med andra penicilliner och cefalosporiner på grund av potentialen för korsresistens. Matning av kalvar med överskottsmjolk som innehåller rester av antibiotika ska undvikas fram till slutet av mjölkarensperioden (undantag under råmjölkperioden), eftersom det kan leda till bakterier med antimikrobiell resistens i kalvens tarmbakterier och öka spridningen av dessa bakterier via avföringen. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur:** Penicillin och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicillin kan leda till korskänslighet mot cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga. 1 - Läkemedlet ska inte hanteras av personer med känslighet eller som rekommenderats att inte arbeta med sådana preparat. 2 - Hantera läkemedlet med stor försiktighet för att undvika exponering och vidta alla försiktighetsåtgärder. 3 - Kontakta läkare om symptom, som exempelvis hudutslag, uppträder efter exponering och visa läkaren denna varning. Svullnad av ansikte, läppar och ögon eller svårighet att andas är allvarigare symptom och kräver omedelbar medicinsk behandling. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj noga med vatten. Vid oav-

siktlig kontakt med huden, tvätta den exponerade huden noga med tvål och vatten. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. **Biverkningar:** Hos diande grisar och slaktsvin har pyrexia, frossa, håglöshet och inkoordination rapporterats i sällsynta fall, vilket kan orsakas av frisättningen av prokain. Systemiska toxiska effekter har observerats hos unga smågrisar, vilka är övergående men kan potentiellt vara dödliga, särskilt vid högre doser. Hos dräktiga saggur och gyltor har flytningar från vulva som kan ha samband med kastning rapporterats i sällsynta fall. Hos nötkreatur har anafylaktiska reaktioner rapporterats i sällsynta fall, vilket kan orsakas av povidoninnehållet. Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter administrering av läkemedlet. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga och inkludera anafylaktisk chock. **Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning:** Det saknas evidens för att detta läkemedel skulle utgöra någon särskild risk för moderdjuret eller fostret. Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Hos dräktiga saggur och gyltor har flytningar från vulva som kan ha samband med kastning dock rapporterats. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning under dräktighet och laktation. **Överdoser:** Vid överdos kan symptom från centrala nervsystemet och/eller konvulsioner förekomma. **Inkompatibiliteter:** Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel. **Hållbarhet:** Hållbarhet i öppnad förpackning: 3 år. Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dygn vid 2-8 °C. **Särskilda förvaringsanvisningar:** Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. SPC 2024-O6-18.

För mer information se [fass.se](#)